

第②類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

非ピリン系鎮痛解熱薬

カイ ソー ゲン
快 爽 源®
® 登録商標

本剤は和漢薬の「地竜」と洋薬の「エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン及びプロモバレリル尿素」を合理的に配合した鎮痛解熱薬です。東洋薬学と西洋薬学の相乗効果により痛みや熱にすぐれた効果を示します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1. 次の人は服用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと

👤 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

Table with 2 columns: 関係部位, 症状. Rows include 皮膚 (発疹・発赤、かゆみ), 消化器 (吐き気・嘔吐、食欲不振), 精神神経系 (めまい), その他 (過度の体温低下).

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起きることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

Table with 2 columns: 症状の名称, 症状. Rows include ショック (アナフィラキシー), 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群), 肝機能障害, 腎障害, 間質性肺炎, ぜんそく.

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能又は効果〕

- 1. 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねん挫痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
2. 悪寒・発熱時の解熱

〔用法・用量〕

次の量をなるべく空腹時をさけて服用する。なお服用間隔は4時間以上おくこと。

Table with 4 columns: 年齢, 成人(15才以上), 11才以上15才未満, 7才以上11才未満. Rows include 一回量, 一日服用回数.

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・含量及び作用〕

9錠(成人の1日服用量)中に次の成分を含んでいます。

Table with 3 columns: はたらき, 成分, 含量. Rows include 熱を下げる・抗炎症作用, いたみをやわらげる・熱を下げる, 鎮静作用, 頭重やへんづつうをやわらげる.

添加物: バレイシヨデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先 天真堂製薬株式会社 お客様相談室
製造販売元 天真堂製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村越495の1
電話 0744(54)3088(代表)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く) 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931