

服用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要ときに読めるよう、大切に保管して下さい。

非ピリン系総合感冒薬

# ハイカゼスター「顆粒」

「かぜは万病のもと」はやくなおしましょう。この顆粒剤は優れた解熱鎮痛剤・気管支拡張剤・鎮咳剤・抗ヒスタミン剤及び中枢興奮剤等を合理的に配合した総合感冒薬です。かぜの諸症状に早く良い効果を発揮します。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こした事がある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気があらわれることがある。)
4. 服用後は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 授乳中の人。  
(4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。  
(5) 高齢者。  
(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(8) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(9) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症	状
皮	ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器		悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系		めまい
その他		排尿困難

裏面もお読み下さい

まれに下記の重篤な症状がおきることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症	状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。	
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。	
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる等）があらわれる。	
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）	
ぜんそく		

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

口のかわき

### 〔効能又は効果〕

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 〔用法・用量〕

次の量を食後約30分以内に、水又はお湯と一緒に服用すること。

年 令	一 回 量	一日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
11才以上15才未満	$\frac{2}{3}$ 包	3 回
7才以上11才未満	$\frac{1}{2}$ 包	3 回
3才以上7才未満	$\frac{1}{3}$ 包	3 回
1才以上3才未満	$\frac{1}{4}$ 包	3 回

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

### 〔成分・分量〕

3包（成人の1日服用量）中に次の成分を含んでいます。

はたらき	成	分	含 量
いたみをやわらげる・熱を下げる	エテンザミド		1500mg
気管支を拡張し咳や痰を鎮める	dl-塩酸メチルエフェドリン		60mg
せきやたんを鎮める	ノスカピン		48mg
くしゃみ、鼻水、鼻づまりに効く	マレイン酸クロルフェニラミン		7.5mg
頭重やへん頭痛に効く	無水カフェイン		75mg

賦形剤としてバレイシヨデンプン及びカンゾウ末、矯味矯臭剤としてケイヒ末を含む  
保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

### ■お問い合わせ先

天真堂製薬株式会社 お客様相談室  
奈良県高市郡明日香村越495の1  
電話 0744(54)3088(代表)  
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 天真堂製薬株式会社  
奈良県高市郡明日香村越495の1