

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるよう、大切に保管して下さい。

学童小児用総合感冒薬

第②類医薬品

# 一風散「顆粒」小児用

“かぜは万病のもと”はやくなおしましょう。  
このかぜ薬は15才未満1才以上の学童小児用につくられたものです。解熱鎮痛薬、鎮咳剤、気管支拡張剤、抗ヒスタミン剤等に加え生薬の地竜エキスが配合されています。洋薬と和漢薬の相乗作用により、かぜの諸症状に優れた効果を発揮します。なお本剤には人工着色料、合成甘味料および防腐剤は含まれていません。

## ⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こした事がある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気があらわれることがある。)
- 服用後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと

### 👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 授乳中の人。  
(4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。  
(5) 高齢者。  
(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(8) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(9) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

裏面もお読み下さい

まれに下記の重篤な症状がおきることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる等）があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合  
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。  
口のかわき

### 【効能又は効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 【用法・用量】

次の量を食後約30分以内に、水又はお湯と一緒に服用すること。

年 令	一 回 量	一日服用回数
11才以上15才未満	1 包	3 回
7才以上11才未満	$\frac{2}{3}$ 包	3 回
3才以上7才未満	$\frac{1}{2}$ 包	3 回
1才以上3才未満	$\frac{1}{3}$ 包	3 回

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。  
(2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

### 【成分・分量】

3包（11才以上15才未満の1日服用量）中に次の成分を含んでいます。

はたらき	成 分	含 量
いたみをやわらげる・熱を下げる	エテンザミド	800mg
気管支を拡張し咳や痰を鎮める	dl-塩酸メチルエフェドリン	40mg
せきやたんを鎮める	ノスカピン	32mg
くしゃみ、鼻水、鼻づまりに効く	マレイン酸クロルフェニラミン	5mg
頭重やへん頭痛に効く	無水カフェイン	50mg

添加物としてヒドロキシプロピルスターチ、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、カンゾウ末およびケイヒ末を含みます。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。  
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。  
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

### ■お問い合わせ先

天真堂製薬株式会社 お客様相談室  
奈良県高市郡明日香村越495の1  
電話 0744(54)3088(代表)  
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 天真堂製薬株式会社  
奈良県高市郡明日香村越495の1